



## Drains trans-tympaniques


**CHU**  
de Liège

**Citadelle**  
Pédiatrie

## Les drains trans-tympaniques, qu'est-ce que c'est ?

Le drain trans-tympanique est un dispositif placé à travers le tympan, qui fait communiquer l'oreille moyenne avec l'oreille externe.

Il permet l'évacuation du liquide stocké derrière le tympan.



## Avant l'opération

Pour aller au bloc opératoire, votre enfant devra :

- \_ Avoir vu l'anesthésiste. Vous recevrez un carnet avec toutes les informations pour l'opération. Vous y trouverez aussi les consentements à la chirurgie et à l'anesthésie que vous devrez signer avant l'opération.
- \_ Rester à jeun (pas boire, pas manger) 8h avant. Il pourra peut-être boire de l'eau sur consigne de l'anesthésiste.
- \_ Enfiler une chemise d'opération (sans sous-vêtements) avec un linge propre.
- \_ Si votre enfant présente de la toux, un nez qui coule, de la fièvre, des diarrhées et/ou vomissements, signalez-le à l'équipe infirmière.
- \_ L'ibuprofène devra être stoppé les 7 jours précédant l'intervention.

## Après l'opération

- \_ Vous pourrez rejoindre votre enfant en salle de réveil.
- \_ Des antidouleurs seront donnés d'office pendant les 24 premières heures pour éviter l'apparition de la douleur. Si celle-ci est tout de même présente, n'hésitez pas à appeler l'équipe infirmière.
- \_ En règle générale et selon l'état de votre enfant, vous pourrez repartir le jour-même.

### Consignes pour le retour à domicile


A la maison, vous devrez surveiller les points suivants :

- \_ Surveiller les écoulements.
- \_ Si votre enfant s'enrhume et que son nez se bouche, les oreilles opérées peuvent couler, ce n'est pas inquiétant. Si l'écoulement persiste après 2 jours malgré les soins de nez, consulter votre pédiatre ou contacter l'ORL.
- \_ Des bouchons faits sur mesure doivent idéalement être utilisés en cas de contact avec l'eau.
- \_ Veiller à ne pas introduire de liquide dans l'oreille tant que les drains sont en place (attention lors de la toilette et à la piscine).
- \_ Des précautions lors des douches et des shampoings doivent être prises : bouchons en caoutchouc ou bonnet de bain.
- \_ Contacter les urgences ou votre médecin traitant si :
  - \_ Vous remarquez un saignement actif.
  - \_ Votre enfant fait de la température.
  - \_ La douleur est incontrôlable malgré les antidouleurs prévus.
  - \_ Votre enfant n'arrive plus à s'alimenter.

Le chirurgien vous donnera les consignes pour la reprise de l'école et du sport.

Les drains tombent tout seuls dans la majorité des cas entre 6 mois et 1 an et demi.

**L'équipe vous souhaite un bon retour.**



Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire au

04 321 66 35 (salle 57)

04 321 60 45 (Urgences)

ou chez votre médecin traitant

