

**FAMILIARISEZ-VOUS AVEC
L'AUTO-INJECTEUR
EPIPEN®
(ADRENALINE)
NOUVELLE
GÉNÉRATION**

EPIPEN® EPIPEN® JUNIOR

(Adrénaline) Auto-injecteurs 0,3/0,15 mg

EPIPEN® EPIPEN® JUNIOR

(Adrénaline) Auto-injecteurs 0,3/0,15 mg

VOICI L'AUTO-INJECTEUR EPIPEN® (ADRÉNALINE) NOUVELLE GÉNÉRATION

Capuchon de sécurité bleu

- Blocage de sécurité, à retirer juste avant l'injection

Mode d'emploi simple

- Accès immédiat au mode d'emploi en cas d'urgence

Fenêtre de contrôle

- Pour s'assurer que la solution est claire et incolore
- Pour vérifier que l'injection s'est bien déroulée (fenêtre foncée après usage)

Protection orange intégrée de l'aiguille

- Protège l'aiguille avant et après usage pour prévenir une blessure accidentelle



Avant usage

Après usage



Avant usage

Après usage



LES MÊMES GESTES SIMPLES POUR UTILISER VOTRE AUTO-INJECTEUR EPIPEN® (ADRÉNALINE) NOUVELLE GÉNÉRATION



Retirez le capuchon de sécurité bleu.



Tenez la pointe orange à environ 10 cm de la face extérieure de la cuisse, poussez fermement contre la face extérieure de la cuisse (vous devez entendre un déclic) et maintenez en place pendant 10 secondes.

APRÈS ADMINISTRATION, DEMANDEZ UNE AIDE MÉDICALE D'URGENCE (Appelez le 100 en Belgique, ou 112 avec un GSM partout en Europe)

N'OUBLIEZ PAS :

- Ayez votre auto-injecteur EpiPen® (adrénaline) en permanence avec vous.
- Il peut être nécessaire d'avoir 2 auto-injecteurs EpiPen® (adrénaline). Consultez la notice.
- Renouvelez votre prescription pour un auto-injecteur EpiPen® (adrénaline) dès que le dispositif atteint la date de péremption.

EPIPEN® EPIPEN® JUNIOR

(Adrénaline) Auto-injecteurs 0,3/0,15 mg

Boîtier de transport avec capuchon facilement amovible, pour un accès rapide à l'auto-injecteur EpiPen®(adrénaline)



Stylo de forme ovale, qui tient bien en main



Utilisez un auto-injecteur de démonstration EpiPen® Trainer gratuit pour s'entraîner à une bonne utilisation en cas d'urgence.

EpiPen 0,3 mg, solution injectable COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 ml contient 1 mg d'adrénaline. Une dose unique de 0,3 ml contient 0,3 mg (300 microgrammes) d'adrénaline. Excipient : chlorure de sodium, métabisulfite de sodium, acide chlorhydrique, eau pour injection. FORME PHARMACEUTIQUE Solution injectable - Solution claire et incolore dans un stylo prérempli (auto-injecteur) INDICATIONS THERAPEUTIQUES L'autoinjecteur est indiqué dans le traitement d'urgence d'un choc anaphylactique ou d'une réaction allergique sévère aux allergènes tels que les piqûres ou morsures d'insecte, les aliments ou les médicaments. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION La dose habituelle pour le traitement d'urgence d'une réaction allergique chez l'adulte est de 0,3 mg d'adrénaline par voie intramusculaire. En l'absence d'amélioration clinique ou si une aggravation survient après le traitement initial, une seconde injection avec un nouvel auto-injecteur d'EpiPen peut être nécessaire. La nouvelle injection peut intervenir 5-15 minutes après la première. Après l'injection, le patient doit consulter un médecin pour une évaluation complémentaire et/ou traitement. CONTRE-INDICATIONS On ne connaît pas de contre-indications absolues pour l'usage d'EpiPen lors du traitement d'urgence d'une réaction allergique. EFFETS INDESIRABLES Effets secondaires associés à l'activité de l'adrénaline sur les récepteurs alpha et bêta comme la tachycardie, l'hypertension et les effets non-désirés sur le système nerveux central. Les effets secondaires habituels sont hyperhidrose, nausées, vomissements, maux de tête, vertiges, asthénie, tremblements et anxiété. L'injection d'adrénaline peut provoquer des troubles du rythme cardiaque. Des ischémies périphériques lors d'une injection accidentelle dans la main ou le pied, ont été rapportés (Voir section 4.4 Mises en garde et précautions). Dans de rares cas, les patients traités par adrénaline ont développé des cardiomyopathies de stress. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Meda Pharma s.a. - Chaussée de la Hulpe, 166 - 1170 Bruxelles NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ BE193916 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Mai 2011

EpiPen Junior 0,15 mg, solution injectable KVALITATIVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml contient 0,5 mg d'adrénaline. Une dose unique de 0,3 ml contient 0,15 mg (150 microgrammes) d'adrénaline. Excipient : chlorure de sodium,

métabisulfite de sodium, acide chlorhydrique, eau pour injection. FORME PHARMACEUTIQUE Solution injectable - Solution claire et incolore dans un stylo prérempli (auto-injecteur) INDICATIONS THERAPEUTIQUES - L'auto-injecteur est indiqué dans le traitement d'urgence d'un choc anaphylactique ou d'une réaction allergique sévère aux allergènes tels que les piqûres ou morsures d'insecte, les aliments ou les médicaments. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION La dose habituelle pour le traitement d'urgence d'une réaction allergique chez les enfants est de 0,15 mg d'adrénaline par voie intramusculaire dépendant du poids corporel du patient (0,01 mg/kg poids corporel). Toutefois, le médecin prescripteur a le choix de prescrire des doses plus ou moins fortes d'adrénaline en se basant sur une évaluation minutieuse et individuelle du patient et en tenant compte de la nature létale de la réaction allergique pour laquelle le produit est prescrit. Si le médecin estime nécessaire d'administrer de moins fortes doses aux petits enfants, il doit envisager d'utiliser d'autres formes d'adrénaline injectable. En l'absence d'amélioration clinique ou si une aggravation survient après le traitement initial, une seconde injection avec un nouvel auto-injecteur d'EpiPen Junior peut être nécessaire. La nouvelle injection peut intervenir 5-15 minutes après la première. Après l'injection, le patient doit consulter un médecin pour une évaluation complémentaire et/ou traitement. CONTRE-INDICATIONS On ne connaît pas de contre-indications absolues pour l'usage d'EpiPen Junior lors du traitement d'urgence d'une réaction allergique. EFFETS INDESIRABLES Effets secondaires associés à l'activité de l'adrénaline sur les récepteurs alpha et bêta comme la tachycardie, l'hypertension et les effets non désirés sur le système nerveux central. Les effets secondaires habituels sont hyperhidrose, nausées, vomissements, maux de tête, vertiges, asthénie, tremblements et anxiété. L'injection d'adrénaline peut provoquer des troubles du rythme cardiaque. Des ischémies périphériques lors d'une injection accidentelle dans la main ou le pied ont été rapportés (Voir section 4.4 Mises en garde et précautions). Dans de rares cas, les patients traités par adrénaline ont développé des cardiomyopathies de stress. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Meda Pharma s.a. - Chaussée de la Hulpe, 166 - 1170 Bruxelles NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ BE193907 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Mai 2011